

Description

Leuciscus leuciscus Linné


La vandoise possède un corps plus élancé que celui du chevaine, sa tête est plus fine, son museau plus pointu et sa bouche plus petite et moins fendue. Sa nageoire anale est concave et sa nageoire caudale est très échancrée. Son iris, ses nageoires pelviennes et anales sont jaune clair.



© Illustration de poisson / R.J. Dunbar 2005

focus...

La vandoise possède une nageoire anale concave. Cette caractéristique permet de la distinguer du chevaine qui possède une nageoire anale convexe.



Régime alimentaire

La vandoise est omnivore et consomme aussi bien des insectes, que des vers, des graines, des poissons ou des végétaux.

Écologie

Cyprinidé de la zone amont, la vandoise vit dans des eaux courantes, fraîches et pures sur fond caillouteux et/ou graveleux. C'est un poisson grégaire qui vit en bancs de plusieurs dizaines d'individus, actifs la nuit et statiques la journée.

Reproduction

La période de reproduction est précédée d'une petite migration vers des zones plus profondes à courant lent. La ponte sur substrat graveleux se déroule du mois de mars au mois de juin dès que la température de l'eau dépasse une douzaine de degrés.

Oufs

75.000 œufs sont pondus par kilo de femelle. Ils mesurent **2 mm** de diamètre et sont de couleur jaune pâle orangé. Leur durée d'incubation est de **300 ° C x Jours**.

Larves

Après éclosion, l'œuf donne naissance à une larve de 7 à 7,5 mm.

Compétition

Il existe une compétition entre le chevaine et la vandoise, toutes deux des espèces rhéophiles qui présentent la même niche écologique. La compétition se fait au détriment de la vandoise écologiquement plus exigeante.

Indicateur

Sensible à la chenalisement, principalement pour la phase de reproduction, et aux diverses pollutions, la vandoise est un bon indicateur de la qualité des eaux.

Adaptabilité

Tout comme le gardon et le rotengle, ce poisson, grâce à sa rusticité, devient un composant majeur des écosystèmes aquatiques d'eau douce suite à l'eutrophisation et au réchauffement des eaux.

Nombre d'écaillés

48 à 55 écaillés sur la ligne latérale.

Tailles courantes

15 à 30 cm pour **0,1 à 0,3 kg**.

*** Le corps de la vandoise est couvert d'écaillés nacrées qui sont fragiles au toucher. ***