

Informations légales



Taille minimale de capture : **pas de limitation**

Nombre de prises autorisées par jour : **20**.

Le vairon est une espèce du **groupe 2**.

Quand le pêcher ?



Pour consulter les périodes d'ouvertures de cette espèce, visitez maisondelapeche.be

Où le pêcher ?



- Viroin
- Eau blanche
- Semois
- Molinee
- Bocq

Pour plus d'infos :
www.parcoursdepeche.be

Comment le pêcher ?

Le vairon se pêche avec une petite canne au coup, à l'asticot ou bien encore au ver de vase.

Cette technique de pêche est détaillée sur :

www.maisondelaapeche.be



Bon appétit !

Omelette aux vairons :

Très appréciée, la préparation de l'omelette aux vairons est un jeu d'enfant.

Avant toute chose il est nécessaire de vider les vairons en pressant leurs flancs, de couper leur tête et de les rincer sous l'eau. Ensuite, les épousser avec du papier absorbant, les passer dans le lait, les rouler dans la farine, puis les frire rapidement dans de l'huile bien chaude. Pendant ce temps battre les œufs, saler, poivrer, et commencer la cuisson des petits dés de pomme de terre. Lorsque les dés sont presque cuits, verser les œufs dessus. Dès que l'omelette commence à prendre, la garnir avec les vairons, et arrêter la cuisson, au bout de quelques secondes.

Servir à table avec de la ciboulette finement ciselée et quelques feuilles de salade.



Rue Lucien Namèche, 10
B-5000 NAMUR
T +32 (0) 81 411 570
info@maisondelapeche.be

Achat en ligne du permis de pêche

www.permisdepeche.be

- Accessibilité des lieux de pêche
- Écoles et stages de pêche
- Restauration des milieux
- Techniques de pêche
- Parcours de pêche
- Hébergements de pêche

www.maisondelaapeche.be

Avec le soutien de :



Wallonie

zone

1

3

zone TRUITE à BARBEAU - Le vairon

Le vairon

Phoxinus phoxinus



La Maison wallonne de la pêche regroupe toutes les Fédérations territoriales de Wallonie. Son but est d'assurer la promotion de la pêche et la protection des milieux aquatiques en Région wallonne. Elle contribue à élaborer le dispositif législatif et réglementaire de protection de l'environnement et de développement de la pêche.

Description

Phoxinus phoxinus

Le ventre du vairon est gris blanchâtre. La couleur de son dos varie entre le vert olive et le brun. Des bandes transversales noires, bleues et jaunes sont présentes sur ses flancs. Une tache dorée est présente sur l'opercule. Sa tête possède un museau arrondi muni d'une petite bouche dont la mâchoire supérieure est légèrement proéminente.



focus...

Son nom provient de la racine latine « vair » qui signifie bigarré, tacheté. Cette même racine est utilisée dans le langage courant pour désigner les cas d'hétérochromie des pupilles : les yeux vairons.

Régime alimentaire

Le vairon est un poisson omnivore qui se nourrit aussi bien de végétaux que d'animaux : diatomées, algues filamenteuses, larves d'insectes, œufs de poissons, vers, crustacés, algues, petits mollusques, etc.

Écologie

Grégaire, le vairon vit en bancs qui sont constitués d'individus de la même famille. Il fréquente les eaux claires et oligotrophes de la zone à truite, mais aussi de la zone à ombre et à barbeau. Il est également présent dans les lacs. Il évite les fonds vaseux et recherche des fonds graveleux peu profonds.

Reproduction

En période de frai (avril à juillet), on observe un dimorphisme sexuel très net. A ce moment, le vairon migre vers l'amont des ruisseaux où il se reproduit en bancs sur les pierres et gravières de faible profondeur. La femelle dépose, en plusieurs pontes, des œufs qui adhèrent aux graviers.

Œufs

1.000 à 5.000 œufs sont pondus par la femelle. Ils mesurent **1 à 1,8 mm** de diamètre et sont soit collés sur les pierres soit présents dans les interstices des pierres ou des cailloux. La durée d'incubation est de **60 °C x Jours**.

Larve

Après éclosion, l'œuf donne naissance à une larve de **2,5 mm**.

Compétition Prédation

Dans les rivières à truites, il existe une compétition alimentaire entre les truites et les vairons au profit de ces derniers qui ont un éventail alimentaire plus grand. Le vairon est prédateur d'alevins vésiculés de truite mais il est également la proie de nombreux poissons piscivores (truites, perches, brochet...).

Défense

Lors d'une attaque, le vairon réagit en sécrétant une substance d'alarme qui avertit ses congénères du danger. Ces cellules sécrétrices de substances d'alarme sont 8 fois plus nombreuses chez la femelle.

Dimorphisme sexuel

Durant la période de reproduction, la femelle est de couleur beaucoup plus terne que le mâle qui devient vivement coloré (dos bleu-noir, ventre rouge et ouïes rosées).

Nombre d'écailles

85 à 100 écailles sur la ligne latérale.

Tailles courantes

5 à 12 cm pour quelques grammes.

© Illustration de poisson / P.J. Dunbar

*** Le vairon est un appât redoutable pour la pêche de la truite ***